

# 石家庄富硒小麦品种销售

生成日期：2025-10-26

山农20小麦种-特征特性半冬性中晚熟品种，成熟期平均比对照石4185晚熟1天左右。幼苗匍匐，分蘖力较强。区试田间试验记载越冬抗寒性较好。春季发育稳健，两极分化快，抽穗稍晚，亩成穗多，穗层整齐。株高78厘米，株型紧凑，旗叶上举、叶色深绿。抗倒性较好。后期成熟落黄正常。穗纺锤型，长芒，白壳，白粒，籽粒角质、较饱满。亩穗数、穗粒数、千粒重。抗寒性鉴定：抗寒性较差。抗病性鉴定：高感赤霉病、纹枯病，中感病，慢条锈病，中抗叶锈病。2009年、2010年品质测定结果分别为：籽粒容重828克/升、808克/升，硬度指数（2009年），蛋白质含量、、28毫升，吸水率、、，比较大抗延阻力、、148毫米，拉伸面积47平方厘米、56平方厘米。栽培技术要点：1. 适宜播种期10月上旬，每亩基本苗15万—18万苗。2. 抽穗前后注意防治蚜虫，同时注意防治纹枯病和赤霉病。3. 春季管理可略晚，控制株高，防倒伏。审定意见：该品种符合国家小麦品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮冬麦区北片的山东省，河北省中南部，山西省南部高水肥地块种植。博信农业科技产品质量好，收到广大业主一致好评。石家庄富硒小麦品种销售

小麦种子批发厂家浅谈用药剂处理种子要对症下药相信生活在农村的人可能多少都了解一些怎么用药剂来处理种子，那就跟着我们小麦种子批发厂家一起来说说这个问题吧！因为小麦的一些土传病病害每年都会发生，而且发展的趋势还越来越厉害，例如说小麦全蚀病、根腐病、茎基腐病以及金针虫等，这些都会影响小麦的质量和产量，如实在田间发现再去，就基本没有效果了，只有从一开始的种子处理，就做一些正确的防控措施。药剂处理小麦种子，要注意对症用药，比如往年金针虫严重，那一定要选择对金针虫有效果的防虫性质的种子处理剂，如果时根腐病全蚀病等病害严重，那一定要有防控病害的杀菌剂性质的种子处理剂，如果希望苗强苗壮赢在起跑线，那就用营养制剂植物生长调节剂性质的药剂处理种子；以往种植户稀里糊涂地拌种了，结果金针虫苗蚜很严重，去咨询，卖药的说只拌了杀菌剂性质处理剂，有的种植户出苗时苗齐苗壮，过一段麦苗陆续发黄瘦弱死亡，去咨询，卖药的说只用植物生长调节剂处理了麦种；所以用药剂处理种子时一定要弄清楚自己需要什么药剂处理，而不是一股脑地说拌种，稀里糊涂地拌了，搭了工费了钱没解决自己想要解决的问题。用药剂处理完种子后，也是摊到塑料布上。石家庄富硒小麦品种销售博信农业科技和客户携手诚信合作，共创辉煌！

小麦种子粒皮薄，无外壳保护，组织松软，吸水能力强，易滋生病虫、发热霉变或发芽。因此，在贮存小麦种子的时候应把好以下六关。一、把好纯度关。小麦良种要单收、单打、单晒、单独贮存。贮存时应标上品种名称，防止与其他品种和普通麦子混淆；要一个容器盛放一个品种，不能一个容器盛几个品种，更不能与普通麦子同存一处；晾晒时要单场单晒，不要与其他品种和普通麦子同晒一场，以防混杂。二、把好水分关。麦种水分含量过大，易发热，会导致霉变，直接影响种子的发芽率和活力。贮藏前要反复晾晒，使麦种含水量达到安全贮藏水分，小麦安全贮藏水分为13%以下。三、把好温度关。温度是影响种子新陈代谢的主要因素，贮存的麦种不宜暴晒过度。切忌在水泥地面上晒种，因水泥地面温度太高，易将种子烧坏；贮存麦种的仓库温度比较好保持在20℃以下。四、把好湿度关。麦种贮藏期间，正值多雨、高温、高湿季节。高温高湿能增强种子的呼吸作用，微生物极易在粮堆内繁殖，引起麦种发热霉变，以致丧失种用能力。因此，麦种应存放在干燥通风处，盛麦种的容器底部要用木板、石块等防潮物铺垫。在贮存过程中应经常晾晒，适时通风换气。五、把好存放关。麦种不能存放在厨房里。

越接近成熟的小麦会掉落越多的种子，而在初几个成长阶段的植株不会掉落种子。繁殖：小麦可以用来繁

殖羊、牛或啮齿，而小麦种子可以用来繁殖鸡。如果同种的两个动物都被喂食了小麦/小麦种子，并且互相看着对方，它们将会进入“求爱模式”（参见繁殖）。在进入求爱模式之后，两只动物会接吻，然后一只幼年动物（如果想知道幼年动物的样子请查阅相应动物的条目）就会诞生。在小动物诞生之后，双亲会跟随幼崽直到它成年（攻击双亲会使它们停止跟随幼崽，不论幼崽成年与否）。你知道吗如果种子所处的环境过于黑暗（亮度低于9），而且接受不到月光照射，它们就会消失。若想加快从草里搜集种子的速度，可以在地上放下水。草丛会因水流而被摧毁，种子就会掉落。博信农业科技生产的产品受到用户的一致称赞。

小麦种子批发如何防止种子病虫害？对于农户来说种植小麦特别害怕遇到的事情就是小麦种子不发芽，小麦发生病虫害，一旦遇到这些事情，就农户这一年的工作都白做了，所以为了解决这一问题，农户们是想尽了办法，变温浸种、恒温浸种、萎锈灵拌种、粉锈宁拌种、石灰水浸种等各种方式，为了大家能了解种子处理，小麦种子批发以石灰水浸种为例，进行了相关讲解。石灰水浸种小麦种子批发建议先用**50kg**水溶解，除去渣滓后浸入选好的麦种，使水面高出种子**10~15cm**并保持静置，不能搅动水面；浸泡时间视气温而定：在气温为20℃时浸泡3~5天，25℃时浸泡2~3天，30℃时只需要1天。浸泡好的麦种不需用清水冲洗，摊开晾干后即可播种，对预防小麦散黑穗病、秆黑粉病、赤霉病、颖枯病、叶枯病等，均有良好的效果。博信农业科技公司秉承着“标准、精细、超越、求精”的质量方针。石家庄富硒小麦品种销售

博信农业科技提供周到的解决方案，满足客户不同的服务需要。石家庄富硒小麦品种销售

可有效防治地下害虫。地下害虫严重发生区可采用土壤处理和种子拌种相结合进行防治，土壤处理可每亩用3%辛硫磷颗粒剂2<sup>~</sup>，随后将其翻入土中。②防治病害：散黑穗病、腥黑穗病、根腐病、纹枯病、全蚀病等发生区，可用40%五氯硝基苯按麦种重量的(每亩40克，拌小麦8千克左右)。防治小麦腥黑穗病，也可选择6%戊唑醇(立克秀)悬浮剂1袋(10毫升)，加水，拌种25~35千克，或氟咯菌腈(适乐时)悬浮剂按推荐剂量进行小麦种子拌种，可兼治秋苗锈病和病。用15%粉锈宁可湿性粉剂按种子重量的三唑酮乳油，拌麦种250千克，可防治病、叶锈病。小麦全蚀病严重发生区，可选用(全蚀净)悬浮剂进行种子处理，对小麦全蚀病有很好的防治效果。一般用全蚀净1袋(20毫升)，先对水300~500毫升，可拌10<sup>~</sup>，拌匀后闷种6~12小时，在阴凉处晾干后播种。小麦黄矮病和丛矮病发生区，可亩用10%吡虫啉30~50克兑水1千克处理种子，防治传毒昆虫，控制小麦黄矮病和丛矮病的发生危害。③多种病害和害虫混合发生区，要大力推广应用杀菌剂和杀虫剂复合的种衣剂或拌种剂进行包衣或种子处理。各地应根据当地主要病虫种类，选择适当配方的种衣剂或拌种剂，其用量一般是复配(混合)剂中单剂的有效成分与单独使用时相同。石家庄富硒小麦品种销售

淄博博信农业科技有限公司成立于2009年，注册资金3950万元，主营小麦、玉米良种科研、繁育、推广；围绕主营业务开展粮食规模种植、粮食购销、粮食烘干及仓储；优良小麦订单；农资、植保、农业技术一系列农业生产服务。未来公司将致力于加强创新，引进先进技术和人才，进一步提升新品种研发培育推广能力，增强规模种植示范作用，努力将公司打造成为鲁中地区小麦良种研发、制种、加工、物流中心。主营产品：小麦种子、邯6172小麦种子、济麦44小麦种子、邯6172小麦种子、济南17小麦种子、鲁原502小麦种子、山农2小麦种子、山农29小麦种子、中麦29小麦种子、藁优5218小麦种子、博信212玉米种子、恒丰107玉米种子、恒丰601玉米种子、鲁单2016玉米种子、淄玉14玉米种子、玉米种子、订单小麦生产、粮食烘干回收、无人机飞防、配方肥。